

## Ulotka dla pacjenta

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Engystol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

---

### **Engystol** **tabletki**

---

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

#### **Skład:**

1 tabletką zawiera:

Substancje czynne: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu.

Zawiera laktozę.

**Zawartość leku w opakowaniu:** 50 lub 250 tabletek.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg Str.- 2-4  
76532 Baden-Baden, Niemcy

### **Spis treści ulotki:**

- 1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Zanim zastosuje się lek Engystol**
- 3. Jak stosować lek Engystol**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Przechowywanie leku Engystol**
- 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Engystol**

### **1.Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje**

Engystol tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

### **2.Zanim zastosuje się lek Engystol**

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli objawy będą się utrzymywać lub ulegną nasileniu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

### **Stosowanie leku Engystol u dzieci:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat ze względu na możliwość zakrztuszenia. O stosowaniu leku u dzieci w wieku 6-12 lat może zdecydować jedynie lekarz.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

### **Stosowanie innych leków:**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **3. Jak stosować lek Engystol**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania:

#### Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

### **W przypadku zażycia większej dawki leku Engystol niż zalecana:**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **W przypadku pominięcia dawki leku Engystol:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Engystol tabletki może powodować działania niepożądane.

Niekiedy, po zastosowaniu leku Engystol, może wystąpić wysypka.

W takich przypadkach należy zaprzestać podawania leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

## **5. Przechowywanie leku Engystol**

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa  
tel. 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *08.2009*

Kod opakowania: