

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Traumeel S ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Traumeel S maść

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

100 g maści zawiera:

Substancje czynne: Arnica montana D3 1,5 g, Calendula officinalis TM 0,45 g, Hamamelis virginiana TM 0,45 g, Echinacea TM 0,15 g, Echinacea purpurea TM 0,15 g, Chamomilla recutita TM 0,15 g, Symphytum officinale D4 0,1 g, Bellis perennis TM 0,1 g, Hypericum perforatum D6 0,09 g, Achillea millefolium TM 0,09 g, Aconitum napellus D1 0,05 g, Atropa bella-donna D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g, Hepar sulfuris D6 0,025 g.

Substancje pomocnicze: emulgowany alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 11,1% (m/m) etanolu.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 lub 100 g.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel
GmbH Dr.-Reckeweg- Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

- 1. Co to jest lek Traumeel S maść i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Zanim zastosuje się lek Traumeel S maść**
- 3. Jak stosować lek Traumeel S maść**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Przechowywanie leku Traumeel S maść**
- 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Traumeel S maść**

1.Co to jest lek Traumeel S maść i w jakim celu się go stosuje

Traumeel S maść jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach takich jak: skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

2.Zanim zastosuje się Traumeel S maść

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jedną z substancji czynnych lub pomocniczych, na arnikę (*Arnica montana*), rumianek (*Chamomilla recutita*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*) lub inne rośliny z rodziny złożonych (*Compositae/Asteraceae*).

Alkohol cetostearylowy może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Nie stosować maści na duże powierzchnie skóry.

Stosowanie leku Traumeel S u dzieci:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 lat należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Traumeel S maść

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Nanosić na chore miejsca i wcierać rano i wieczorem. Nie stosować w opatrunku zamkniętym.

Uwaga! Nie stosować maści na duże powierzchnie skóry ani bezpośrednio na otwarte rany. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Traumeel S maść

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Traumeel S maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Traumeel S maść może powodować działania niepożądane. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (zapalenie skóry, zaczerwienienie, obrzęk i świąd). Należy wtedy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.Przechowywanie leku Traumeel S maść

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *08.2009*

Kod opakowania: