

Informacja o leku

Traumeel ®S

Tabletki podjęzykowe

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletkę zawiera: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, Achillea millefolium D3 ana 15 mg; Atropa belladonna D4 75 mg; Aconitum napellus D3. Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris D8 ana 30 mg; Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D 8 ana 24 mg; Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 ana 6 mg; Hypericum perforatum D2 3 mg, laktozę.

Wskazania

Preparat należy stosować w przypadkach urazów (sportowych i powypadkowych) takich jak: skręcenia, zwichnięcia, krwiaki, złamania, wstrząśnienie mózgu itp. Lek może być również stosowany w przypadkach pourazowych lub pooperacyjnych obrzęków i wysięków oraz w procesach zapalnych i zwyrodnieniowych dotyczących różnych organów i tkanek, w tym wątroby oraz narządów ruchu.

Korzystne efekty stosowania Traumeel S obserwowano w przypadkach astmy oskrzelowej, zapalenia wyrostka rylcowatego, zapalenia kaletki maziowych, zapalenia okołostawowego stawu ramiennie-łopatkowego, stanów zwyrodnieniowych stawu biodrowego, kolanowego i małych stawów, chorób tkanek przyzębia, paradontozy, ropni kieszonek dziąsłowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jedną z substancji czynnych lub pomocniczych, lub na rośliny z rodziny Compositae. Zasadniczo nie powinno się stosować tego leku w przypadku takich postępujących schorzeń układowych, jak gruźlica, białaczka, stwardnienie rozsiane, nosicielstwo HIV, AIDS oraz kolagenozy i inne choroby autoimmunologiczne.

Działania niepożądane

W razie wystąpienia ślinotoku należy odstawić lek. W sporadycznych przypadkach mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Po zastosowaniu leków zawierających substancje z roślin z rodzaju Echinacea i innych roślin z rodziny Compositae obserwowano niekiedy osutkę skórą, świąd, rzadziej obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego.

Interakcje z innymi lekami

Nie stwierdzono.

Dawkowanie i sposób stosowania

Zwykle 1 tabletkę 3 razy dziennie podjęzykowo. Na początku leczenia 1 tabletkę co 30 minut przez okres ok.2 godzin

Rodzaje opakowań

Opakowania zawierające 50 i 250 tabletek.

**LEK CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM
ŚWIATŁA SŁONECZNEGO !**

**LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU
NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!**

Uwaga

Lek chłonie wilgoć, co może sprzyjać powstawaniu ciemnego nalotu na tabletkach. Nie należy wyjmować większej liczby tabletek na dłoń przed użyciem.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.Reckeweg Strasse 2-4,

Postfach 729 D-76484

Baden-Baden, Germany

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

tel. 22-545-07-15